

本草品彙精要

本草品彙精要卷之三十八

菜部上品

五種神農本草經

朱字

七種名醫別錄

黑字

二種唐本先附

注云唐附

一十三種宋本先附

注云宋附

一種陳藏器餘

已上總二十八種

冬葵子

附 根 葉

莧實

胡荽

附 宋 子 附

邪蒿

附 宋

苘蒿

附 宋

胡瓜葉

附 黃瓜也 宋 附 根 實 附

石胡荽

附 宋

蕪菁

附 卽蔓菁 也 子 附

白冬瓜

白瓜子

甜瓜

附 宋 附 子 葉 附

瓜蒂

附 花

越瓜

附 宋

芥

白芥

附 宋 附 子 附

萊菔

附 卽蘿蔔也 子 附 唐 附

菘

附 紫花 菘 附

苦菜

苳子

附 葉 子

黃蜀葵花

附 宋 子 附

紅蜀葵

附 宋 附 根 葉 等 附

龍葵

附 唐 子 附

苦耽

附 宋

苦苣

附 宋

苜蓿

薺

根實附

羅勒

朱附子根附

一種陳藏器餘

蕨

[illegible]

本草品彙精要卷之三十八

菜部上品

菜之草

冬葵子

無毒

植生

冬葵子

出神農本經

主五臟六腑寒熱羸瘦五癰利小便

久服堅骨長肌肉輕身延年

以上朱字神農本經

療婦人乳難

內閉○葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便○葉

爲百菜主其心傷人

以上黑字名醫所錄

苗

詩豳風云七月亨

反昔庚葵及菽葵菜

也山陰陸氏云葵有紫白二種葵心隨日光所轉輒低覆其根爾雅云莖大葉小花紫紅色者可茹

圖經

曰其子是秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵

子古方入藥用最多苗葉作菜茹更甘美其種早者

俗呼為

地

圖經

曰

生

少

室

時

生

秋

採

春

收

暴

用

子及

葵菜也

地

山今處處有之

時

生

秋

採

春

收

乾

用

根葉

質

子而小

色

黑

味

甘

性

寒

氣

陽中之陰

臭

朽

主

利小

便

助

黃芩為

治

療

圖經

曰

葉作

茹宣

導積

壅

黃汁

服之

利小

腸孕

婦臨

產

黃汁

服之

利小

易產燒灰及乾擣末

傅金瘡

○根治惡瘡及小兒誤

吞錢

煮汁服之立出

藥性論

云

子治五淋

如腫下乳

汁○葉單

煮汁服治時行黃病

孟詵

云

女人產時困

悶以子一合

水二鍾煮取半鍾

去滓頓服之少時便

產

衍義

曰

子治患癰

癰毒熱腫

內攻未出膿者

水吞

三五枚遂作竅膿出

孫真人

云

葵能充脾氣

別錄

云

三五枚遂作竅膿出

孫真人

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

三五枚遂作竅膿出

孫真人

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

三五枚遂作竅膿出

孫真人

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

三五枚遂作竅膿出

孫真人

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

葵能充脾氣

別錄

云

生葵菜葉絞汁散小兒發斑惡毒氣少少與服之。
葵根五大斤切以水五升煮取三升平旦飲一服止
消渴利及口吻瘡掘經年葵根燒灰傅之亦治小兒
瘡。妊娠卒下血葵子一升水五鍾煮取二鍾分
三服差亦治妊娠患淋并大便不通。葵菜治諸癰
瘡先以泔清溫洗以綿拭水微火煖貼瘡上引膿不
過三二百葉膿盡卽肉補日華子云冬葵

生忌諸雜魚蒜房室等

久服堅筋骨

倉

根燒灰和豬脂

塗疔瘡生身面上汁黃者。煮葵菜葉合蒜齏啖之
治天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿惡毒氣者。葵莖
及子爲末合酒服方寸匕治妬乳乳癰。葵子爲末
合酒服方寸匕治兒死腹中若口噤不開格也舉口灌
之藥下卽活。葵子二升水四升煮取一升內豬脂
如雞子大一丸治卒關格大小便不通脹滿欲死者
○葵子炒令黃擣末合酒服禁葵菜若患天行病後
二錢七治倒生手足冷口噤食之頓喪明熱食之

令人熱悶甚動風氣無蒜勿食四季月食生葵令飲
食不消化發宿疾霜葵生食動五種留飲多食吐水
亦不可合鯉解服丹石毒以葵菜喫一頓佳冬月葵
魚食能害人解痘汁解服丹石人發舌乾咳嗽每食
後飲一盞便卧少
時差根解蜀椒毒

莧實

無毒

植生

莧實

出神農
本經

主青盲白腎明目除邪利大小便去寒

熱久服益氣力不饑輕身

以上朱字
神農本經

殺虵蟲

以上黑
字名醫

所

名

人莧

莫實

細莧

糠莧

紫莧

豬莧

錄

胡莧

赤莧

花莧

白莧

蘆

五色莧

苗

圖經曰莧實卽人莧子也經云細莧亦同其葉如藍
是也按莧有六種有人莧白莧紫莧馬莧五色莧馬

莧卽馬齒莧也自見後條入藥者惟人白二莧亦謂之糠莧胡莧細莧其實一也有細莧俗謂之野莧豬好食之又名豬莧但人莧小而白莧大耳其子霜後方熟實細而黑紫莧莖葉通紫赤莧亦謂之花莧莖葉深赤爾雅所謂藟赤莧也根莖亦可糟藏食之甘美五色莧今亦稀用

地 圖經曰生淮陽川澤及田

中今處 **時** 生春生 **採** 十一月 **收** 日 **用** 實 **色** 青 **味** 甘 **性** 寒

氣 氣之薄者 **臭** 朽 **主** 明目利 **治** 療 圖經曰子主翳

熱紫莧主氣痢又取擣汁飲一升滓以水和塗瘡上○赤莧主血痢及射工毒中人令寒熱發瘡偏在一

處有異於常者連莖葉擣汁飲一升差○豬莧主衆蛇螫人唐本注云赤葉莧主射工沙蠱毒日華子云

莧菜通九竅 **補** 日華子云莧子益 **倉** 五月五日採 **說** 云莧除熱 **精** 孟說云莧補氣 莧菜和馬齒

莧等分爲末服不可與鼈同食生鼈癰以鼈細剉
之治妊娠易產禁和莧於近水濕處置於土穴內上
以上蓋之一
宿盡成鼈也

胡荽

微毒
附子

叢生

胡荽消穀治五臟補不足利大小腸通小腹氣拔四
肢熱止頭痛療沙疹豌豆瘡不出作酒飲之立出通
心竅○子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱五痔及食

肉中毒下血煮冷取汁服

名醫所錄
名
香荽
荽荽
苗
謹按胡荽
卽今荽荽

也佈子熟地生苗葉似芹而圓小嫩時食之其味香
美至春暮開白花結實如防風子其莖經冬不萎焚

之亦可以

地

圖經曰出并州今處處有之

時

生春秋採夏收子五月五日取

別錄云春夏取

收

陰乾

用

莖葉及子

色

青

味

辛

性

溫

氣

氣之厚者

葉秋冬取莖根

陽也

臭

香

主

補益筋脉消穀能食

製

子炒用

治

療

陳藏器云子治蟲毒五野雞病食療

云胡荽利五臟

別錄云小兒赤丹不止擣汁傅之差

脫肛細切一升燒煙薰即入。齒痛以子五升水五

升煮取一升含之。根治熱氣結滯經年數發以五

月五日採半斤陰乾水七升煮取一升半去滓分服

未差更服春夏用

補

食療云

倉

子合醋煮熨腸頭出

葉秋冬用莖根

益筋脉

倉

甚効。合生菜食治

腸風熱餅裹食甚良。胡荽二三兩切合酒二大盞

煎令沸沃胡荽便以物合定不令洩氣候冷去滓治

小兒疹痘欲令速出者微微從頂已下噴遍身除

面不噴。根絞汁半斤合酒服之立下蠱毒神驗

禁

胡荽久食令人多忘損精神發腋臭及罌齒口氣臭
患金瘡者不可食食之疾更加久冷人食之脚弱根
發癰**解**食諸毒肉吐下血不止頓痿黃者取淨胡荽
疾子一升煮令腹破取汁停冷服半升一日一
夜二服
即止

邪蒿

無毒

植生

邪蒿主胸膈中臭爛惡邪氣利腸胃通血脉續不足

氣作羹食良

名醫所錄

名

山花羣蒿

苗

謹按邪蒿春生苗葉其莖微方高一二尺節間

敷葉葉似青蒿而細軟至夏繁茂開黃白細花
作穗秋末莖葉凋殘嫩時人亦採作羹食之

地

出山

野及園圃中皆有之

時

生春採

無時

收

陰乾

用

葉莖

色

青綠

味

辛

性

溫平

氣

氣之厚者**臭****腥****主**利腸胃**倉**煑令熟和醬醋食之治陽中之陰**香**通血脉**倉**五臟邪氣厭穀者及腸

辟大渴熱中**禁**不可與胡荽同暴疾惡瘡**禁**食令人汗臭氣

茼蒿

無毒

叢生

茼蒿主安心氣養脾胃消水飲

名醫所錄

名

蓬蒿

苗

謹按茼蒿不限

時月播子於畦至旬日而苗葉漸生及月遂繁茂開碎黃花作莢而生細子其葉似蓬又謂蓬蒿人取其嫩者以作菜茹或入茶食之更**地**人家園圃**時**生無香美然治療之功則未可據

採

無時

收

乾陰

用

葉莖

色

青綠

味

辛

性

平散

氣

氣厚味薄

臭

香

禁

不可多食動風氣熏人心令人氣滿

菜之走

胡瓜葉

小毒附根
實有毒

蔓生

胡瓜葉主小兒閃癖一歲服一葉已上斟酌與之生
授絞汁服得吐下○根擣傅胡刺毒腫○實味甘寒
有毒不可多食動寒熱多瘡病積瘀熱發疰氣令人
虛熱上逆少氣發百病及瘡疥損陰血脉氣發脚氣
天行後不可食小兒切忌滑中生疳蟲不與醋同食

名醫
所錄

名

黃瓜

苗

謹按胡瓜卽今之黃瓜也圃人二月佈
子於地三月生苗移植漸茂蔓延垣籬

而開黃花葉青黃色皆有微刺其葉稍大於甜瓜葉
 結實圓徑一二寸長尺許北人呼為黃瓜為石勒諱
 因而不改然有青皮者亦有白皮者人以為蔬而生
 噉之別無功用食之亦不益人一種秋間生者質頗
 相同俗呼為地處處生春採夏秋收陰用葉及
 秋黃瓜也有之苗取乾根實色
 青白味苦性平氣味厚於臭腥治療孫真人云蛇咬取
 倉胡瓜一箇破作兩片不出子以醋煮一半水煮一
 半俱爛空心頓服治水病肚脹至四肢腫服後須
 更下水

菜之草

石胡荽無毒

植生

石胡荽通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去腎熱授

內鼻中腎自落

名醫所錄

名

鵝不食草

苗

謹按食胡荽春生苗葉莖圓而中空折之

有白汁節間生葉青綠色其花細白至夏作叢而開
子葉與胡荽無異此草鵝皆不食故名鵝不食草人
採入藥欲辨之必以飼鵝鵝不食者為真鵝誤食之則死也
地生田野及水**時**生
春生**採**秋**收**陰**用**莖**色**青**味**辛**性**寒**氣**氣之薄者**臭**
苗**取**乾**葉****綠**
香

蕪菁

無毒

叢生

蕪菁主利五臟輕身益氣○子主明目

名醫所錄

名

蔓菁蕪菁

葇蕖

葇 芥

大芥

蔓莢

蔓子

諸葛菜

風蓰

須

苗

圖經曰蕪菁即蔓菁也梗短葉大連

地上生闊葉紅花四時仍有春食苗夏食心亦謂之

蔓子秋冬食根亦可以備饑歲菜中之最有益者惟

是此耳諸葛亮所止令兵士獨種蔓菁者取其纔出

甲可生啖一也葉舒可煮食二也久居則隨以滋長

三也棄不令惜四也圃即易尋而採之五也冬有根

可斷切足食六也比諸蔬屬其利不亦博乎今三蜀

江陵呼蔓菁為

地

圖經曰舊出河朔今處處有之

時

生春苗四採春

諸葛菜是也

夏葉秋

用

苗葉根子

質

菜類菘

色

青

味

苦

性

溫

氣

味厚於氣陰中之陽

臭

腥

主

通中益氣

製

子九蒸九暴

治

療

圖經曰實久服可以辟穀除發黃利小腸并治

青盲唐本注云子治癥瘕積聚水煮二升取膿汁服

止霍亂心腹脹取汁少飲治目暗為末服陳藏器云

蕪菁消黃疸及急黃內黃腹結不通擣爲末水絞汁服當得嚏鼻中出黃水及下痢。子爲油入面膏令人去黑黥。孟詵云蕪菁消食下氣。子壓油塗頭能變蒜髮又研入面脂極去皺又擣水和服除熱黃結實不通少頃當瀉一切惡物沙石草髮並出。食療云根止消渴并熱毒風腫。別錄云子治陰黃汗染衣涕唾黃者擣末平旦以井花水服一匙日再加至兩匙以知爲度色漸退白則差不過服五升愈及癰疽着手足肩背累累如米起色白刮之水出復發熱以蕪菁子熟擣帛裹傅之卽止妊娠小便不利爲末水服方寸七。蕪菁常食之通中益氣令人肥健。根治豌豆瘡擣汁挑瘡破傅之食頃根出及男子陰腫如斗大核痛以根擣傅之。虛勞眼暗三月採蔓菁花陰乾爲末以井花水每空心調下二錢七久服長生可夜讀書。蔓菁汁治犬咬傷服之佳又立春後庚子日以蕪菁汁合家大小並溫服不限多少可除時

疾

補圖

經曰

子九蒸九暴擣爲粉服之長生

蕭

倉

蕭

兩云

子入丸藥用令人肥健尤宜婦人

蕭

倉

蕭

和油傅蜘蛛咬恐毒入肉亦擣末合酒服。根生擣和鹽醋漿水煮汁洗女子妒乳腫洗五六度差又擣和雞子白封之妙。根葉淨擇去土不用水洗以鹽擣傅乳癰痛寒熱者傅上熱卽換不過三五易之差冬月無葉卽用根宜避風。根大者削去皮熟擣合苦酒和如泥煮三沸急攪之出傅卒起腫毒急痛以帛裹上日三易之。蔓菁子六升一物蒸之看氣遍合甑下以釜中熱湯淋之暴乾還淋如是三遍卽杵篩爲末食後清酒服二寸七治青盲瞳子不壞者十得九愈。蔓菁子三兩爲末每合溫酒服一錢七治風疹入腹身體強舌乾燥硬。合酢和傅禿瘡。蕪菁子三升以苦酒三升煮令熟日乾爲末以井花水服方寸七加至三七

禁

根多食令人氣脹滿

解

毒

菜之走

白冬瓜 無毒

蔓生

白冬瓜主除小服水脹利小便止渴

名醫所錄苗圖經曰蔓生布

地莖葉有毛開黃花實生蔓下大者如斗而更長皮厚初生有毛青綠色但經霜則白如傅粉故謂之白冬瓜也人以藏蓄作菜入藥須霜後採者為佳

苗採八九月取用肉色皮青味甘性微寒氣陽中之陰臭腥

主消熱毒止煩悶治療圖經曰肉止三消渴疾及積熱利大

性論云練汁能止煩躁熱及利小腸除消渴并五淋日華子云冬瓜除煩胸膈熱消熱毒癰腫切摩痈子

甚良。○葉殺蟲詩云：莫予荍蜂，自求辛螫，亦可修事。蜂兒荍腫毒及蜂叮藤燒灰可出繭點黠洗黑黠并洗瘡疥濕瓢亦可漱練白縑。**孟詵云**：冬瓜除胸心滿悶頭面熱者食之佳。**衍義曰**：冬瓜治發背及一切癰疽削一大塊置瘡上熱則易之瓜當爛截去更合之分散熱毒甚良。**別錄云**：小兒渴利單擣瓜汁飲之及傷寒後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾冬瓜一枚黃土泥厚裹五寸煨令爛熱去土絞汁服之及治水病初得危急冬瓜不限多少任喫神効。小兒一月**補**至五箇月乍寒乍熱炮冬瓜絞汁服治渴不止。**孟詵云**：益**禁**患冷者食之瘦人九月勿食**解**壓丹石氣耐老**禁**被霜瓜食之令人成反胃病**解**毒并魚中毒飲瓜汁最驗

白瓜子

無毒

蔓生

白瓜子

出神農本經

主令人悅澤好顏色益氣不饑久服

輕身耐老

以上朱字神農本經

除煩滿不樂久服寒中可作面

脂令面悅澤

以上黑字名醫所錄

名

水芝

切綬

白

苗

謹按白瓜子即前條冬瓜

子也冬瓜皮雖青經霜亦白其中子則方正潔白比次整齊非他子形色之可比故謂之白瓜子歲時記云七月採犀以為脂者此也唐本作甘瓜者由其甘白字畫所誤考之別錄有可作面脂之說正與本經相符此實冬

時

生春生

採

八九月取

收

暴乾

色

白

味

甘

性

平寒

氣

氣之薄者陽中之陰

製

圖經曰洗淨搗取仁用

治

療圖經曰仁搗作面藥洗燥皴日華子

云去皮膚風及

倉

瓜子熬作末合酒服治多年損傷不差。瓜子七升絹袋盛絞沸湯

黑點潤肌膚

中三遍以酢五升漬一宿暴乾擣篩合酒服方寸七日三服治男子五勞七傷明日延年不老及去皮擣爲丸空腹服三十丸令人白淨如玉

甜瓜

有毒

蔓生

甜瓜止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡動宿冷

病發虛熱破腹又令人憊憊弱脚手無力少食卽止

渴利小便通三焦間壅塞氣兼主口鼻瘡○葉治人

無髮擣汁塗之卽生

名醫所錄

苗

謹按甜瓜二月佈種三月生苗作蔓布地與諸

瓜相似五月開黃花花下結實有青白二種至秋熟則黃色下條瓜蒂卽此青瓜蒂也

地

圖經曰生

本草綱目卷之八

嵩高平澤今處處
園圃中皆蒔之
時生春生採七月
取實**用**瓜及
色生青

味甘
性寒
氣氣之薄者
陽中之陰
臭香
治療唐本注云
除腹內結聚破潰

膿血最為腸胃脾內壅之要藥
太過去油為末水調服
別錄云瓜去皮食後啖之止

熱除煩渴煮
補食療云子熟補中益
皮作羹亦佳
氣宜人
葉補中
倉葉碾末合酒
服治打撲損

折去瘀血及小兒疳
子作末合蜜為丸如
棗核大每旦淨漱含一丸治口臭亦可傳齒
禁患脚

食甜瓜其患未不除又五月甜瓜沉水及兩帶者並
殺人多食發黃疸病動冷疾令人虛羸亦動痼疾多

食下利消
損陽氣
解諸藥力及食瓜飽脹者入
水自消或食鹽即化成水

瓜蒂
毒有
蔓生

瓜蒂

出神農本經

主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬

逆上氣及食諸果病在胸腹中皆吐下之

以上朱字神農本經

去鼻中息肉療黃疸○花主心痛欬逆

以上黑字名醫所錄

苗

圖經曰瓜蒂即甜瓜蒂也瓜有青白二種入藥當以

青者為勝凡吐劑以此為聖藥也故今之治風癇喉

風痰涎暴塞之證多以此合赤小豆輩服之蓋取其

味酸苦相搏為湧泄之義耳正合內經所謂邪在上

者因而

地

圖經曰生嵩高平澤今處處園圃中蒔之

時

生春生

採

七月七日取

收

去瓜皮用蒂約半寸許陰乾

用

花蒂及

色

青

味

苦

性

寒

氣

氣薄味厚陰也

臭

香

主

吐膈散中

製

剉碎研細用

治

療

日華子云治腦塞熱艱眼昏吐痰別錄云時氣

三日外忽覺心滿堅硬脚手心熱變黃以瓜蒂七枚
杵末以大豆許吹兩鼻中令黃水出餘末水調服得
吐黃水一二升差。瓜丁治黃疸目黃不除爲細
末以大豆許內鼻中令病人深吸取鼻中黃水出
瓜蒂及莖合小豆丁香吹鼻治鼻中瘰肉艷鼻并黃
。陳瓜蒂一分爲末合羊脂少許和傅鼻中瘰肉。
瓜蒂四十九箇六月六日收者丁香四十九箇用甘
竭子燒煙盡爲度細研爲末每用一字吹鼻內治遍
身黃如金色小兒用半字吹鼻內及揩牙。瓜蒂二
小合熬赤小豆二合爲末煖漿水五合服方寸匕治
急黃心上堅硬渴欲得水喫氣息喘麤眼黃飲之當
吐不吐再服五分匕亦減之若吹鼻中兩三黑豆許
黃水出歇。瓜蒂爲細末量疾每用一二錢匕合膩
粉一錢匕以水半合同調勻灌之治風涎暴作氣塞
倒臥服之良久涎自出或覺有涎用諸藥行化不下
或服藥良久涎未出者含沙糖一塊下咽涎卽出此

含

勝石碌礪砂輩勝甚不損人全**禁**胃弱及病後產後勿輕用諸亡血諸虛家亦不可用**解**過服吐不
止以麝香末少許
水調服之即止

越瓜

無毒

蔓生

越瓜主利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡令人
虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與

牛乳酪及鮓同食及空心食令人心痛

名醫所錄

苗

謹按越瓜

二月佈種三月生苗蔓延於地五月開淡黃花葉青
大有微刺葉下結實如甜瓜正圓而色白因生於越

地故名

地

出杭越今處處有之

時

生

春採

夏

取

用

肉

質

類甜瓜

而白

色

白
味 甘
性 寒
氣 氣之薄者
臭 香
主 利小便
治 療陳藏
器云

宣洩
倉 小者糟藏之為灰傅口吻瘡及陰莖熱
熱氣
瘡 越瓜和飯作餅并菹久食益腸胃
夏月不可食冷中常令人臍下為
解 酒
癥痛不止及天行病後不可食
毒

菜之草

芥
無
毒
叢生

芥歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中久食溫中

名醫
名 青芥 南芥 花芥
所錄 紫芥 旋芥 石芥
苗 圖經曰芥似菘而有
毛味極辛辣此即青

芥也芥之種亦多有紫芥莖葉純紫多作蘼食之最
美又有南芥旋芥花芥石芥之類皆菜茹之美者非

藥品所須不復悉錄唐本注云葉大麤者葉堪食子

入藥用熨惡症至良葉小子細者葉不堪食其子但

堪作地圖經曰處處有時生春採夏收收暴用莖葉

莖也之道地蜀州種子乾及子

質似菰而有毛色青紫味辛性溫氣氣之厚臭腥治

療日華子云芥除邪氣止咳嗽及冷氣疾食療云治

欬逆下氣明目去頭風別錄云馬芥子治小兒緊

唇搗汁令先搯唇血出傳倉子搗為末合醋和塗射

之日七遍馬芥即刺芥也工毒及症氣發無常處

合醋研傳風毒腫及麻痺合生薑研暖塗貼撲

損瘀血腰痛腎冷合酒醋服止心痛合雞子白

調傳走疰風毒疼痛子一升醋三升煎取一升治

婦人中風口噤舌本縮傳頰下立効搗碎合人

乳調和綿裹塞耳內治聾搗碎合水及蜜和禁芥

滓傳喉上下乾即易之治癭有五種不過此方禁黃

三

食之動氣生食之發丹石葉
不可多食細葉有毛者殺人

忌 與兔肉同食生惡瘡

白芥

無毒 附子

叢生

白芥主冷氣○子主射工及疰氣上氣發汗胸膈痰

冷面黃

名醫所錄

苗 圖經曰芥類頗多此亦是一種也莖葉雖白與諸芥相似但其子獨麤大

甚辛色白如梁米入藥惟以此種最佳也其葉作茹甚美

地 圖經曰生河東今處此種最佳也其葉作茹甚美

原為佳

時 生春生採夏取

收 暴乾

用 實

質 似菰而有毛

實 實類兔絲子

色

白

味 辛

性 溫

氣 氣之厚

者陽也

臭 腥

主 冷氣安五臟

主脇下痰癖

子

治

療

日華子云白芥安五臟

倉

子一升擣碎以絹袋盛好酒二升浸七日空心

子燒之及服可辟邪魅

瀝服三合日二服治氣。日乾爲末合酒服方寸匕。治反胃吐食上氣。杵令熟合苦酒厚傅三種射工毒半日痛卽止。爲末合豬膽和如泥傅遊腫諸癰日三易効。合苦酒煮治中風卒不語傅頸一周以帛包之一日夕差。炒熟勿令焦細研以湯浸蒸餅丸如赤小豆大合生薑湯吞七丸治肚腹冷夜起甚効。

萊菔根

無毒
附子

叢生

萊菔

音

根散服及炮煮服食大下氣消穀去痰癖肥

健人生擣汁服主消渴試大有驗

名醫
所錄

名

蘿蔔
蘆菔
電

溫菘
蘆菔

苗

圖經曰有大小二種大者肉堅宜蒸食之小者白而脆宜生啖也。謹按萊菔卽蘿

葡萄也六月初伏內佈子於熟地苗葉漸長尺餘似白
菰菜莖半圓而微赤莖葉俱有細毛至秋深其根堅
實小者如拳大者如碗圃人欲留其作種故不採其
根也北地九月則採之藏於窖中至春復種於地仍
生苗葉三月開紫白花四月作莢其實如馬蘭子圓
匾而赤洪州信陽亦有甚大者重五六斤或近一秤
又有一種小者初春播種之即生苗葉根白脆長甘
而少辛隨可生食夏末開花時不中食之俗呼為水
蘿葡萄

地

圖經曰出河北秦晉甚多

時

生夏生採秋取

用

子根

質

類蕪菁而大

色

白

味

甘辛

性

溫散

氣

氣之厚者陽也

主

消飲食下滯氣

治

療

圖經曰

根治飲食過多飽脹宜生嚼之。子水

研服吐風涎甚効唐本注云葉消食和中日華

子云

根消痰止欬及治肺痿吐血蕭炳云根消食利

關節理顏色滌五臟惡氣孟詵云利五臟別錄云治

偏頭風用生蘿蔔汁一蜺殼仰卧注之鼻中左痛注
左右痛注右左右俱注亦得神効。積年上氣咳嗽
多痰喘促唾膿血以子補日華子云蘿蔔溫中補不
一合研煎湯食上服之足孟詵云食之令人肌細
白〔倉〕蘿蔔合羊肉鯽魚煮食之治勞瘦欬嗽。子合
淨〔醋〕研消腫毒。出了子蘿蔔三枚淨洗薄切日
乾爲末每服二錢合煎豬肉汁澄清調下治消渴食
後并夜卧日三服謂之獨勝散。子半斤淘洗焙乾
於銚子內炒令黃熟爲末以沙糖〔禁〕服地黃何首烏
丸如彈綿裹含之治肺痿咳嗽〔禁〕人勿食蘿蔔若
同食之則令人髭髮〔解〕蘿蔔解
易白乃損血故也〔麪〕毒

菘菜無毒

叢生

菘音膏主通利腸胃除胸中煩解酒渴名醫錄〔名〕菜白〔苗〕圖

曰其苗與蕪菁相類梗長葉不光者為蕪菁梗短葉闊厚而肥痺者為菘舊說菘不生北土人有將子北土種之初一年半為蕪菁二年菘種都絕南人種蕪菁亦然其有數種牛肚菘葉最大厚味甘紫菘葉薄細味小苦揚州一種葉圓而大若筴重有一二十斤生噉之脆美無粗絕勝他土者此謂之白菘也衍義曰張仲景傷寒論凡用甘草皆禁菘菜者此菘菜也葉如蕪菁綠色差淡其味微苦而嫩稍闊耳圖經曰舊不載所出州土今南北皆有之道地揚州者為勝時生春生採夏秋用

莖葉實質蕪菁類蕪色淡綠味甘性溫氣氣之厚臭腥治療蕭炳

云消食下氣祛瘴氣止熱噉冬取汁飲為佳陳士良云紫花菘行風氣去邪熱食療云菘止消渴冬月作菹煮作羹食之別錄云作羹啜之通利腸胃除胸中煩熱及治小兒赤遊行於上下至心即死杵菘菜傳

之治發背杵地菰汁一升日再服差。治酒醉
不醒用菰子二合細研井花水一盞調為二服
和粟米酒服方
寸七辟瘟病
風冷虛人勿
食食之覺冷
惟生薑能
制其毒

苦菜 無毒

植生

苦菜 出神農本經 主五臟邪氣厭於協切 穀胃痹久服安

心益氣聰察少卧輕身耐老 以上朱字 腸澀渴熱中

疾惡瘡耐饑寒豪氣不老 以上黑字 名 茶草 游冬
名醫所錄 董茶 選

苗 衍義曰苦菜葉似苦苣而狹綠色差淡折之有白汁出常常點瘕子自落花與野菊相似春夏秋皆

旋開花四方皆有在北道則冬方凋斃生南方則冬

夏常青此月令小滿節後所謂苦菜秀者是也又有

一種苦識味苦寒有小毒擣葉傅小兒閃癰煮汁服

去暴熱目黃秘塞然其葉極似龍葵但龍葵子無殼

苦識子有殼如皮弁子圓 **地** 圖經曰生益州川谷

如珠人亦呼為小苦耽也 **時** 山陵道傍道地蜀川

生 春採 三月 乾陰 **用** 葉莖 **質** 葉類苦 **色** 青 **味** 苦 **性** 寒 **氣**

苗 三日 乾陰 **用** 葉莖 **質** 葉類苦 **色** 青 **味** 苦 **性** 寒 **氣**

味厚於 **臭** 腥 **主** 除腸澼 **治** 療 衍義曰花去

氣陰也 **治** 去邪氣 **療** 中熱安心神

菜之木

荏子

無毒附葉子

植生

荏子主欬逆下氣溫中補體○葉性溫主調中去臭

氣

名醫

名

荏

苗

陶隱居云

荏狀如蘇高大白色不甚香其子研之雜米作糜甚肥美下氣

補益東人呼為荏鯨以其似蘇字但除禾邊故也竿

其子作油用煎之即今油帛及和漆所用者服食斷

穀亦用之名為重油唐本注云荏葉人常生食其子

故不及蘇也江東以荏子為油北土以大麻為油此

二油俱堪油物若以和漆荏者為強爾蕭炳云又有

大荏形似野荏高大葉大小荏一倍不堪食人收其

子以充油絹帛與大麻子同其小荏子欲

熟人採其角食甚香美大荏葉不堪食也

東今北地生春生採九月收陰

多產之苗取乾用葉子及質類蘇高

色

白

味

辛

性

溫

氣

氣之厚者陽也

臭

微香

治

療唐本注云葉擣傳蟲咬及

男子陰腫日華子云葉調氣潤心肺長肌膚消宿食
 止上氣咳嗽去狐臭傳蛇咬。子下氣止嗽食療云
 子止欬逆下氣補日華子云子補中益氣通血脉填
 生食止渴潤肺 精髓可蒸令熟烈日暴乾當口開
 春取米食之 **含** 子研之合雜米作糜食之甚肥美能
 亦可休糧 **下** 氣補益。葉生搗和醋封男子陰
 腫女人綿裏內之三四易差。 **禁** 子壓作油少破
 葉爛杵合豬脂和薄傅臍中人 **氣** 多食發心悶

黃蜀葵
無毒

植生

黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水久不

差者作末傳之即愈

名醫所錄 **苗** 圖經曰春生苗漸高丈

頗相似但其葉尖狹而多刻缺夏末開花淡黃色其實作彙長寸餘有四五瓣上銳下圓亦微有毛衍義

曰此與蜀葵別種非為蜀葵中黃者也葉心下有紫
檀色摘之別為數處就日乾之不爾即浥爛今瘡家
用之為圖經曰處
要藥也地處有之時生春生採六七收陰用花色

黃

臭

香

製

子

研爛用

治

療

圖經曰

花治瘡癰乾末水

調塗之立愈○子治淋澁

又令婦人易產衍義曰花日乾為末浥爛瘡○子臨
產時取四十九粒研爛用溫水調服即產別錄云子
催產焙乾為末并華水下三錢七如無
子以根細切煎汁令膿滑待冷服之

菜之草

紅蜀葵

無毒

植

蜀葵久食鈍人性靈○根及莖並主客熱利小便散

膿血惡汁○葉燒爲末傅金瘡煮食主丹石發熱結
擣碎傅火瘡葉炙煮與小兒食治熱毒下痢及大人
丹痢擣汁服亦可恐腹痛卽暖飲之○花冷無毒治
小兒風疹○子冷無毒治淋澁通小腸催生落胎療
水腫治一切瘡疥并癰疽赤靨○白花療疥瘡去邪

氣陰乾末食之

名醫所錄

名

錦葵戎葵

苗

圖經曰

葵有數種有蜀葵爾雅所謂葍也

切戎葵者是也郭璞云似葵華如槿華戎蜀蓋其所
自出因以名之也○謹按蜀葵皆自宿根而生也春
初發苗漸長莖幹高及丈許微有白毛葉圓而尖至
五六月開花有深紅淺紅者亦有單瓣夾瓣者俱著

花於莖間自下而上次第開放直至稍端葉乃始焦其子遂成子熟墮地卽出嫩苗比與宿根者終不繁茂又有一種錦葵開紫白花甚小亦結細子其種蒔及莖葉最相類但低矮差小爲異功用更强葵雖有五色而治療功能各隨其色而主之抑按左傳曰鮑莊子之知不及葵葵猶能衛其足今葵心隨日光所轉輒低覆其根似知孔子曰禾生垂穗向根不忘本也蓋禾之向根仁也葵之衛足知也仁所以守之知所以揆之故

地

圖經曰出戎蜀今處處有之

時

生春苗採夏花

採

秋

收

陰乾

葵曰揆也

用花根莖

色

紅

味

甘

性

寒

氣

氣之薄者陽中之陰

臭

腥

治

療

衍

義

曰單葉葵根治帶下排膿血惡物別

倉

葵花末合酒服方寸七治

錄云蜀葵治癰毒無頭杵末傅之

倉

葵花末合酒服方寸七治

橫生倒產。白葵花一兩陰乾爲末空心合溫酒服

二錢七治婦人白帶下臍腹冷痛面色痿黃日漸虛

困如赤帶用赤者為驗

禁 患狗咬瘡者食之不得差又能鈍人情性

龍葵

無毒 附子

叢生

龍葵食之解勞少睡去虛熱腫○子療疔腫

名醫所錄**名**

苦**苗**

圖經曰龍葵北人謂之苦葵葉圓似排風而無毛花白實若牛李子生青熟黑亦似排風子但

堪煮食不任生噉其實赤者名赤珠服之變白令黑其根亦入藥用

地 圖經曰出北方今所在有之

時

生春採

無**收**

乾日**用**

根莖子

味

苦**性**

寒**氣**

味厚於

治

療

別錄云龍葵治癰補藥性論云龍葵明目輕

腫無頭擣傳之身○子變白令黑耐老

倉 根一

羅為末合麝香一分研令勻塗發背癰疽

成膿者○龍葵合土杵傳疔腫及火丹瘡

禁 不可與葱薤同

成膿者○龍葵合土杵傳疔腫及火丹瘡

禁 不可與葱薤同

食

苦耽

小毒

植生

苦耽苗子主傳尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅瘰癧痞滿小兒無辜癰子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁服亦生搗絞汁服亦研傳小兒閃癖

名醫所錄

名

洛神珠

王母

苗

圖經曰

苗高二三尺實作包如撮口袋中有子如珠生青熟赤

關中謂之洛神珠又謂之王母珠一名皮弁草又有一種小者名苦識也按衍義云此與酸漿同種今復

出於此蓋其性味不同地圖經曰生故墟垣時生春
及治療有別而然也漸間今在處有之

苗採三月取苗收陰用苗味苦性寒氣味厚於製煮

秋取實乾實洩氣陰也汁

或生
擣用

苦苣

叢生

苦苣除面目及舌下黃強力不睡折取莖中白汁傅
疔腫出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉傅蛇咬根主
赤白痢及骨蒸並煮服之今人種爲菜生食之久食
輕身少睡調十二經脉利五臟霍亂後胃氣逆煩生

擣汁飲之雖冷甚益人不可同血食一本作蜜食發痔疾

名醫所錄**名**白苣**苗**本經云苦苣即野苣也春生苗葉青綠色其莖折之有白汁堪作菜茹亦

可生食又有野生者名福苣今人家常食為白苣地江外嶺南吳人無白苣嘗植野苣以供厨饌也

舊不著所出州土今山郭處皆有之**時**生春生採夏取莖葉秋取根**收**陰用葉

及根**味**苦**性**平洩寒云**氣**味厚於氣陰也**臭**腥**製**為末或生擣汁用**治**療衍義

曰擣汁傳疔瘡殊驗青苗陰乾以備冬月為末水調傳

苣菹無毒叢生

苣菹主安中利人可久食名醫所錄**苗**陶隱居云長安中乃有苣菹園北人

甚重之江南人不甚食以其無味故也外國別有苜蓿草以療目疾蓋非此類衍義曰唐李白詩云天馬常銜苜蓿花是此陝西甚多以飼牛馬嫩時人亦食之微甘淡不可多食利人大小腸有宿根刈訖又生其根酷似黃芪故土人採之以亂黃芪也
時生春生採夏秋
收陰乾
用莖葉及根

色綠
味苦
性平
氣味厚於氣陰中之陽
臭腥
治療唐本注云莖葉根治熱病

煩滿目黃赤小便黃酒疸擣汁服一升令人吐利即愈日華子云去腹臟邪氣脾胃間熱氣通小腸
補孟詵云能利五臟洗去脾胃間邪氣及諸惡熱毒輕身健人
倉和醋作羹食之
禁不宜多食多則冷氣入筋瘦人又利大小腸

齊無毒
散生

薺主利肝氣和中○實主明目目痛

名醫所錄

苗

謹按薺春生最

先於諸菜似菠菜小而著地散生葉有鋸齒而青綠有毛其根色白二月抽薹高尺許莖有小葉三月開細白花結三尖莢子四月成實其地處處有之時生春生葉霜後則微赤而經冬不彫也

採四月八

日取實

收

用

質

色

味

性

氣

氣之厚者陽也

臭

主

治

療

藥性論云

子治目青盲

不見物○根葉燒灰能

治赤白痢極効

日華子云

薺菜利五臟○根治目痛

孟詵云

子治眼疾

別錄云

根汁治暴赤眼疼痛

溼

點目

補

藥性論云

禁

患氣人食其子動冷疾及不可

中効

五臟不足

與麴同食令人背悶服丹石人

亦不可

食之

羅勒

微毒

叢生

羅勒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒根爛
瘡爲灰用甚良不可過多食壅關節澀榮衛令血脉
不行又動風發氣患碗取汁服半合定冬月用乾者
煮之○子主目瞖及物入目三五顆致目中少頃當
濕脹與物俱出又療風赤眵淚○根主小兒黃爛瘡

燒灰傳之佳

名醫所錄

名

蘭香王母菜

苗

陶隱居云術家取羊角馬蹄燒作灰撒於

濕地遍踏之卽生羅勒俗呼爲王母菜食之益人此
有三種一種堪作生菜一種葉大二十步內聞香一

種似紫蘇葉也
地
舊不著所出州土
時
生無採無
收
乾陰
用
葉莖

實
味
辛
性
溫散
氣
氣之厚者陽也
臭
香
倉
合木蘭香一斤以三歲米醋浸令沒百日

出暴乾爲末傳面上滅癰合醋
醬漬百日出日乾末服方寸七

一種陳藏器餘

蕨葉似老蕨根如紫草按蕨味甘寒滑去暴熱利水道令人睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹食之四皓食之而壽夷齊食蕨而天固非良物搜神記云郝鑒鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺

心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨遂明

此物不可生食之也○食療

寒補五臟不足氣壅經絡筋骨間毒氣令人脚

弱不能行消陽事令眼暗鼻中塞髮落不可食又冷氣人食之多腹脹○毛詩陟彼南山言采其蕨又曰言采其薇是蕨薇俱可食○伯夷叔齊採薇而食恐蕨非薇也今永康道江居民多以醋淹而食之

本草品彙精要卷之三十八

本草品彙精要卷之三十九

菜部中品

六種神農本草經

朱字

六種名醫別錄

黑字

二種唐本先附

注云唐附

一種唐慎微附

七種今補

一種陳藏器餘

已上總二十三種

生薑

自草部
今移

乾薑

自草部
今移

蓼實

馬蓼等
六種附

葱實

莖花根
白汁附

韭

子根
附

薤

菹菜

甜音

荊芥

舊多
假蘇

白藜荷

紫蘇

附子

水蘇

香薷

薄荷

唐附

胡蘆

今補

甘露子

今補

蘑菰

今補

香菜

今補

薇菜

今補

天花

今補

胡蘿蔔

今補

秦荻梨

唐附五
辛菜附

醍醐菜

唐慎微附

一種陳藏器餘

翹搖

[illegible]

本草品彙精要卷之三十九

菜部中品

菜之草

生薑

無毒

叢生

生薑主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去臭

氣通神明

名醫所錄

名

薑母

苗

圖經曰

苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根

黃無花實圃人種蒔用葦箔棚覆其上**地**圖經曰生以避日至深秋採之為嘔家之聖藥也**地**犍為川谷

及荊州揚州今處處有之

時

生

春生

採

八九月

收

以濕

道地漢州溫州池州者良

苗

取根

土培
用 根
色 黃
味 辛
性 溫
氣 輕陽也
臭 香
主 嘔逆去

助 秦椒為
之使
反 惡黃芩黃
連天鼠糞
製 洗去土去皮即熱留皮則
冷入藥切片或搗汁用

治 療陶隱居云歸五臟止嘔吐除風邪寒熱藥性論
云消痰水氣滿止嗽及時疾嘔逆不下食陳藏

器云破血調中去冷開胃氣孟詵云止逆散煩悶
汁作煎下一切結實衝胸膈惡氣食療曰除壯熱轉

筋心滿去胸中臭氣通神明湯液本草云益脾胃散
風寒別錄云止乾嘔若手足厥冷宜食生薑又產後

穢汚下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即下患
霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下生薑一斤切以

水七升煮取二升分作三服治狐臭生薑塗腋下絕
根又小兒咳嗽用四兩煎湯沐浴又胎後血上衝心

以五兩切用水八
盞煮三盞分三服
倉 合半夏療心下急痛。搗汁合
蜜服治中熱不能食。汁合杏

仁作煎服治一切結氣實心胸壅隔冷熱氣。以八兩合生附子四兩四破之二物同水五升煮取二升分再服療痰癖及卒風服此禁豬肉冷水。以生薑切如麻粒大合好茶一兩椀呷任意治痢若熱痢薑留皮冷痢去皮用。合大棗散風寒益元氣。合芍藥溫經散寒。薑汁半雞子殼合生地黃汁少許蜜一匙頭和水三合頓服治胃氣虛風熱不能食。皮作屑末合酒服療偏風。以三兩擣破合酒一升煮三四沸頓服療霍亂注痢不止轉筋入腹欲死者。汁半合合蜜一匙頭煎令熟溫服如此三服療久患咳噫連咳四五十年者。以八兩細切用水三升煮取一升半夏五合洗去滑以水五升煮取一升二味合煮取一升半稍稍服之治

禁

夜間勿食

解

殺半夏
芫荽毒

又制厚
朴毒

乾薑

無毒

乾薑

出神農本經

主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風

濕痺腸澼下痢生者尤良

以上朱字神農本經

寒冷腹痛中惡

霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血

以上黑字名醫所錄

地

圖經曰乾薑乃秋取生薑於長流水洗過日曬為之漢州所作之法以水淹三日去皮又置流水中

六日更刮去皮然後暴之令乾釀於瓮中三日乃成也陶隱居云出臨海章安惟兩三村解作之蜀漢薑

舊美荊州有好薑而並不能作乾者今溫州及池州出一種白色者謂之白乾薑入藥最勝

收

乾日

色

蒼

味

辛炮之則苦

性

溫大熱

氣

氣之厚者陽也

臭

香

主

生則逐寒邪而發表

炮則除胃

製

洗淨以濕紙裹入灰火中

治

療

唐本注

冷而守中

炮之令熱透取出剉碎用

云治風

止血宣諸絡脉發汗藥性論云除腰腎中冷疼令氣

破血去風通四肢關節開五臟六腑去風毒令癰夜

多小便止嗽溫中及血閉病人虛冷者宜加用日華

子云治轉筋吐瀉腹臟冷反胃乾嘔撲損瘀血止鼻

洪解冷熱毒隔胃消宿食除痰下氣湯液本草云補

下焦去裏寒及脾中寒熱邪氣別錄云蠍螫人嚼塗

患處又鼻衄以乾薑削令頭尖微煨塞鼻中即止傷

寒陰陽易病手足拘急欲死者以四兩為末湯調連

服被覆出汗得手足伸即愈制音

惡犬咬人為末內瘡中立差

倉

合秦艽療霍亂

脹滿冷痢。合高良薑等分為末用一錢水一中盞

煎至七分服治瘧不痊者。作末合蜜和丸塞鼻中

治鼽鼻。合黑附子為引用名薑附湯治傷寒沉寒

痼冷腎中無陽脉氣欲絕者効。合雄黃等分同研

用小絹袋盛男左女右繫臂上辟蛇毒蛇聞藥氣逆避之及治蛇毒螫人欲死者搗傅螫毒處。乾薑火燒令黑存性梔蓋候冷爲末合米飲調一錢服之治血痢神効。作末合酒調服一錢治寒嗽冷氣結脹又治頭旋眼眩。白乾薑以漿水煮令透濕焙乾搗爲末合陳廩米粥飲爲丸如梧子大一服三五十枚湯使任用療脾胃虛冷不下食羸弱成瘵者。爲末合粥飲調服一錢療水瀉無度及止卒心痛
禁
久服令人眼暗多用則耗散元氣

蓼實

無毒附馬蓼水蓼赤蓼

植生

蓼實

出神農本經

主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫

癰瘍○馬蓼去腸中蛭蟲輕身

以上朱字神農本經

蓼實葉歸

舌除大小腸邪氣利中益志

以上黑字
名醫所錄

名

紫蓼 紅蓼

青蓼

香蓼

天蓼

茶蓼

馬蓼

木蓼

木蓼

籠鼓

虞蓼

歸紅草

蓄虞蓼

苗

曰蓼 圖經

類甚多有紫赤二種葉俱小狹而厚青香二種葉亦相似而俱薄馬水二種葉俱闊大上有黑點此六種花皆黃白子皆青黑木蓼亦名天蓼亦有小大二種蔓生葉似柘葉花黃白子皮青滑爾雅所謂蓄虞蓼是也**衍義**曰蓼實即神農本經第十一卷中木蓼之子也彼言蓼則用莖此言實即用子故此復論子之功故分為**地****時****生****採****收**二條耳澤今在處有之

暴

用

實

色

青

味

辛

性

溫

氣

氣之厚者陽也

臭

腥

主

風冷 痲痺

治

療 陶

隱居云青蓼釀酒除風冷唐本注云水蓼搗傅蛇傷根莖並用及搗汁服止蛇毒入腹心悶者又水煮漬

脚掣之消脚氣腫藥性論云蓼實歸鼻除腎氣兼能去癰瘍。葉祛邪氣陳藏器云蓼主疰癘每日取一服煮服之療霍亂轉筋多取煮湯極熱掣脚。葉搗傳療狐刺瘡及小兒頭瘡孟詵云子通五臟壅氣別錄云熱渴心悶濃煮蓼汁一大盞分爲二服飲之或夏月渴死者濃煮三升灌之亦愈脚痛成瘡剉水蓼煮湯頻頻淋洗候瘡乾自安霍亂轉筋取蓼以手把去兩頭以水二升半煮取一升半頓服之倉合白蜜雞子白塗小兒頭瘡蟲出不作癢。先切蓼葉以水三升煮取二升合蓼子一把香豉一升內於汁中更煮取一升半分三服療霍亂轉筋。赤蓼燒灰淋汁浸掣暴脚軟人及蒸桑葉晉之立愈。赤蓼莖葉切三合以水一盞酒三合煎至四合去粗分溫二服治肝虛轉筋。蓼根細判合酒浸服治血氣攻心痛不可忍者差禁多食令人吐水及損陽氣忌與魚鱸同食二月勿食水蓼食之傷腎忌令人陰冷痛

氣欲絕

葱實

無毒

植生

葱實

出神農本草經

主明目補中不足○莖可作湯主傷寒

寒熱出汗中風面目腫

以上朱字神農本草經

葱白平傷寒骨肉

痛喉痹不通安胎歸目除肝邪氣安中利五臟益目

睛殺百藥毒○葱根主傷寒頭痛○葱汁平溫主溺

血

以上黑字名醫所錄

名

山葱

凍葱

漢葱

茗

苗

圖經曰葱有數

種入藥用山葱胡葱食品用凍葱漢葱山葱生山中細莖大葉食之香美於常葱一名茗葱爾雅所謂茗

山葱是也胡葱類食葱而根莖皆細白又云莖葉細短如金燈者是也舊云生蜀郡山谷似大蒜而小形圓皮赤梢長而銳凍葱冬夏常有但分莖栽蒔而無子氣味最佳亦入藥用一名冬葱又有一種樓葱亦冬葱類也江南人呼龍角葱言其苗有八角故爾淮楚間多種之漢葱莖實硬而味薄冬即葉枯凡葱皆能殺魚肉毒食品所不可闕也

地

圖經曰處

時

生春生苗三月開花

採

五月收實

收

暴

用

實莖根

色

黑

味

辛

性

溫

氣

氣厚味薄陽也

臭

腥

主

葱白行手

太陰經足陽明經

治

療圖經曰

葉及莖去水病兩足腫者煮令爛漬之日三五次愈又打撲損傷

取葱新折者便入塘火煨熱剝去皮擘開其間有涕便將晉損處仍多煨取續續易熱者佳日華子云葱止天行時疾頭痛熱狂通大小腸霍亂轉筋及貢豚氣脚氣心腹痛目眩并止心迷悶金瘡水入靴腫煨

研醫傳〔墨本云〕胡葱能消腫痛〔孟詵云〕根主瘡中有
水風腫疼痛者〔食療云〕葱止血衄利小便。葱鬚及
白通氣主傷寒頭痛〔別錄云〕腸痔大便常血取白三
五斤煮作湯盆中坐立差又急氣淋陰腎腫用泥葱
半斤煨過爛貼臍上又胎動五六月因篤難〔倉〕胡
救者葱白一大握水三升煎取一升去滓頓服
合小蒜茱萸煮汁浸或搗傅諸惡截狐尿刺毒及山
溪中沙蠶射工等毒。莖葉合鹽研〔晉〕蛇蟲傷處及
中射工溪毒。葱花一升合吳茱萸一升以水一大
升八合煎七合去滓分二服止脾心痛痛則腹脹如
錐刀刺者。青葉合乾薑黃檗煮作湯浸洗患瘡中
有風水腫疼者。葱白合酢搗封小腹上治大小便
不通。葱白二十莖合大棗二十枚以水三升煎取
二升分服療霍亂後煩躁卧不安穩。葱合米煮粥
空心食療赤白痢。葱鬚陰乾爲末二錢合蒲州膽
礬一錢研勻以一字入竹管中吹喉中瘡腫病處

禁

不可多食食則拔氣上衝人五臟悶絕虛人患氣者多食發氣

忌

不可與蜜同食食則促氣殺人

解

殺一切魚肉毒

韭

無毒

叢生

韭歸心安五臟除胃中熱利病人可久食○子主夢

泄精溺白○根主養髮

名醫所錄

苗

圖經曰初生如麥秋深抽莖著花乃菜種

之最久者故謂之韭圃人種蒔一歲而三四次割之其根不傷至冬壅培先春復生信乎一種而久者也此物最溫而益人宜常食之易稽覽圖云政道得則陰物變為陽若葱變為韭是也然則葱寒而韭溫可驗矣又有一種山韭形性亦相類但葉如燈心苗為異爾雅所謂藿於六山韭也山中往往有之而人多

不識耳〔行義曰〕春食則香夏食則臭其未出土者為
韭黃最不益人食之滯氣益含抑鬱未達之氣故也
孔子所謂不時〔圖經曰〕處有之〔時生春生採無葉根不食正謂此輩〕

色 綠青 **味** 酸辛微 **性** 溫 **氣** 氣厚味薄陽中之陰 **臭** 臭臭 **主** 益陽泄精尿血 **製** 搗汁

用 **治** 療〔日華子云〕止尿血除心腹痞冷胸中痹冷疰瘕氣并腹痛及中風失音研汁服心脾骨痛

甚生研服蛇犬咬并惡瘡搗傅。子治鬼交〔陳藏器云〕溫中下氣令人能食止洩白膿腹冷痛並煮食之

○葉及根療狂犬咬人欲發者亦殺諸蛇虺蠍惡蟲

毒○根搗汁服除胸痹骨痛不可觸者○韭子生吞

三十粒空心鹽湯下止夢泄精及溺白〔孟詵云〕胸痹

心中急痛如錐刺不得俛仰自汗或痛徹背上不治

或至死可取生韭或根五斤洗搗汁灌少許即吐胸

中惡血〔蕭炳云〕小兒初生與韭根汁灌之即吐出惡

水別錄云百蟲入耳擣韭汁灌耳中差喉腫不下食

以韭一把擣熬傅之冷則易之又卧忽不寤勿以火

照之殺人但痛嚙拇指甲際而唾其面則活取韭汁

吹鼻孔冬月取根汁灌口中亦得又卒上氣鳴息便

欲絕擣韭汁飲一升愈止水穀痢作羹粥燂炒任食

又漆瘡韭葉研傅又小兒患黃穢韭根汁滴鼻中如

大豆補日華子云補虛和腑臟益陽止含子合桑螵

許泄精暖腰膝食之令人肥白蛸龍骨療

漏精。葉合煮鮑魚鮓斷卒下痢。根擣合醬汁灌

馬鼻蟲類。子合龍骨服甚補中。韭子二兩微炒

爲散食前合酒下二錢七治虛勞腎損夢中泄精。

韭根炒存性旋擣末合豬脂油傅五般瘡癰上三五

度禁多食昏神暗目霜韭不可生食花食忌不可與

動風酒後及熱病後勿食食之發困蜜同食

解毒藥

薤 無毒

叢生

薤

出神農本草經

主金瘡瘡敗輕身不饑耐老

以上朱字神農本草經歸

於骨菜芝也除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡

中風寒水腫以塗之

以上黑字名醫所錄

名

與薤同薤鴻薤切勤巨盈山薤

苗

圖經曰

薤似韭而葉闊多白無實人家種者有赤白

二種皆春分蒔之至冬而葉枯爾雅云薤鴻薤又云

勤山薤莖葉亦與家薤相類而根長葉差大僅若鹿

葱體性亦與家薤同然今少用薤雖辛而不葷五臟

故道家常餌之兼補虛最宜人凡用葱

地

魯山平澤今處處有

之

時

生

春生林

無

用

白薤

質

類韭而葉闊多白

色

青

味

辛

性

溫散

氣

氣厚味薄
陽中之陰

臭

臭

主

療瘡
生肌

行

手陽
明經

製

去葉
用

治

療圖經
曰

薤

白止霍亂乾嘔不息。薤根除卒得胸痛差而復發者搗汁飲之立止。日華子曰薤止久痢冷瀉食療云薤白止金瘡生肌肉生搗封之更以火就炙令熱氣徹瘡中乾則易之作羹食之除女子赤白帶下并骨鯁在咽不下者食之即下行。義曰薤白治肺氣喘急取其滑泄也。別錄云薤白治誤吞釵取曝令萎黃煮使熟勿切長食一大束釵即隨出及止赤白痢取一握切煮作粥食之又除目中風腫痛并頭卒痛者。薤汁治中惡或先病者或常居寢卧奄忽而絕者灌鼻中差及治虎犬咬人飲一升日三差若傷手足已中木毒及犯惡露風寒腫補日華子云薤輕身耐寒痛杵薤炙熱搗瘡上便愈。調中補不足肥健人孟詵云學道人常食之可通。寤薤白切一升豬脂一斤神安魂魄益氣續筋骨。細切合苦酒浸經宿微

火煎三上三下去滓傳炙瘡腫痛。薤白二握生搗如泥合粳米粉蜜調相和捏作餅炙取熟不過三兩服止疳痢。薤白合蜜同搗塗湯火瘡其効甚速。**禁**薤不可與牛肉同食食食生薤多啼唾三月四月不可生食發熱病人不宜食。**解**薤白同黃檗煮服之可生食發熱病人不宜食。枲汁服二三升即解。

恭菜

無毒

叢生

恭

甜音

菜主時行壯熱解風熱毒

名醫所錄

苗

圖經曰苗似升麻葉似紫

菊而大春秋播種於畦而生莖高一二尺若蒴藿而有細稜四月開白花六月結子其莢與諸菜不同此菜夏盛而冬枯也。**地**處處有之。**時**生春生**採**五月**收**煤過**用**莖葉及子

色

青綠

味

甘苦

性

大寒

氣

味厚於氣陰也

臭

腥

主

除冷熱痢

治

止血生肌

療

陶隱

居云蒸菜除時行熱病初得便擣汁飲之差唐本注

云夏月以此菜研作粥食之解熱及止熱毒痢并擣

傅灸瘡止痛易差日華子云炙作熟水飲開胃通心

隔陳藏器云蒸菜止冷熱痢擣汁服之及止血生肌

亦治人與禽獸有折傷處傳之立愈孟詵云子煮半

生擣汁含止小兒熱陳士良云蒸菜食之宜婦人

倉

子合醋浸之揩面令面潤澤有光

菜之木

荊芥

無毒

植生

荊芥主寒熱鼠瘻癰癰生瘡破結聚氣下瘀血除濕

痹

神農本草經

名

芥 假蘇

苗

落藜而細初生香辛可噉人

圖經曰

荆芥即假蘇也葉似

有胡荆芥俗呼為新羅荆芥石荆芥體性相近入藥

取作生菜食之江左人以其香氣似蘇故名假蘇又

亦

地

生漢中川澤今處處有之

時

生春生採夏秋取

收

暴乾用花實成穗者佳

質

葉似落藜而細

色

青

味

辛

性

溫

氣

氣味俱薄

臭

香

主

祛風

發汗

碎用

治

唐本注云去邪出汗除冷風煮汁服

製

之藥性論云治惡風賊風口面喎斜遍身癢痹心虛

忘事辟邪毒氣治疔腫取一握切以水五升煮取二

升冷分二服主通利血脉傳送五臟不足氣日華子

云利五臟消食下氣醒酒作菜生熟食之陳士良云

治血勞風氣壅滿背脊疼痛虛汗丈夫脚氣筋骨

補

煩疼及陰陽毒傷寒頭痛頭眩目眩手足筋急

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

藥性論云

倉

搗末合酢封疔腫及風毒腫。合茶煎食之止頭風并出汗。合豉汁煎服治

暴傷寒。穗擣篩爲末每服二錢七合童子小便一

酒盞調熱服治產後血暈築心眼倒風縮欲死者。

爲末合酒服二錢七治產後中風身強直眼反折四

肢搐搦。青荊芥一斤青薄荷一斤以砂盆內一處

研生絹絞汁於甕器內看厚薄煎成膏餘滓三分去

一分漉滓不用將二分滓日乾爲末以膏和爲丸如

梧桐子大每服二十丸早

禁

多食熏五臟神久食動渴疾

至暮可三服忌食動風物

菜之草

白蘘荷

有小毒

植生

白蘘荷主中蠱及瘡

名醫所錄

名

嘉草覆菹

苗

圖經曰春初生葉似甘蕉葉根

似薑而肥其根莖堪為菹其性好陰在木下生者尤美然有赤白二種白者入藥昔人呼為覆菹赤者堪噉及作梅果多用之潘岳閑居賦云藁荷依陰時藿向陽也周禮蕡氏以嘉草除蠱毒宗懔鉅禁以謂嘉草即藁圖經曰荆襄江湖間時生春生採八九收荷是也地多種之北地亦有葉

陰用莖葉味辛性微氣氣之厚臭朽主惡瘡製雷公乾及根

使以銅刀刮上麤皮一重了細切入砂盆中研如膏只收取自然汁煉作煎却於新盆器中攤令冷如乾膠煎刮治療圖經曰藁荷除喉痹乾末水服之陶隱取研用居云白者除溪毒及沙蟲輩唐本注云

根治諸惡瘡。根心去稻麥芒入目中不出者以汁注目中即出別錄云根葉除傷寒時氣瘟病頭痛壯熱脉盛生擣絞汁服三四升差及治卒吐血痔血婦人患腰痛取向東根一把擣汁服之又治喉中似物

吞吐不出腹脹羸瘦亦取根汁服蠱立出。治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死以葉蜜安病人席下勿令知覺使病者自呼蠱主姓名差。**合** 藁荷根二兩研絞取汁時溫服半錢治風冷失聲咽喉不利。根合酒漬半日含漱其汁治喉中及口舌生瘡爛。根細切煎取二升空心人酒調服。治婦人月信滯澀。**禁** 多食損藥勢。**解** 殺蠱毒。**屬** 革牛偽。

菜之木

紫蘇 無毒 附子

植生

紫蘇主下氣除寒中。子尤良。**名** 桂 蘇 乃 紫 名醫所錄 圖經曰

蘇也苗高二三尺莖方葉圓葉下紫色而氣甚香夏採莖葉秋採實俱堪入藥用之爾雅謂蘇爲桂荏蓋以其味辛而形類荏乃名之然蘇有數種有白蘇魚蘇山魚蘇皆是荏類白蘇亦是方莖圓葉不紫亦甚香實亦入藥魚蘇似茵陳大葉而香吳人以煮魚故名魚薺薺生山石間者又名山魚蘇也陶隱居云葉下紫色而氣甚香者入藥最佳其無紫色不香似荏者名野蘇不堪用

地

圖經曰舊不著所出州土

今處處有之

時

生春生採夏取莖葉

收

乾日用莖葉

色

紫

味

辛

性

溫

氣

氣厚味薄陽也

臭

香

主

解肌發表開胃下食

製

去根剉碎

用

治

療

圖經曰莖葉通心經益脾胃煮飲尤勝單用

莖去節能宣通風毒雞瘕藥性論云子除上

氣欬逆冷氣及腰脚中濕風結氣研汁煮粥良日華子云除心腹脹滿止霍亂轉筋一切冷氣脚氣通大

小腸。子調中益五臟下氣止霍亂嘔吐反胃利大小便破癥結消五膈止嗽潤心肺消痰氣。**孟詵云**除寒熱。**衍義曰**子。**補圖經曰**子常食之令人肥健肥定肺氣喘急。白身香。**日華子云**子補虛勞。

倉

子合橘皮服能下氣。子合高良薑橘皮等分蜜丸空心下十丸治一切宿冷氣及脚濕風。子一升微炒杵以生絹袋盛內三斗清酒中浸三宿少少飲之祛風順氣利腸。子一升熬杵爲末合酒服方寸匕日再服治夢遺失精。紫蘇不限多少於大鍋內水煎令乾後去滓熬膏以赤小豆炒熟杵末調煎爲丸如梧子大合酒下三十丸至五十丸治失血常服瘥。紫蘇二兩杵碎水二升研取汁以蘇子汁煮粳米合作粥和葱豉椒薑食之治脚氣及風寒濕痹四肢攣急脚腫不可踐地者。**禁**紫蘇湯多脾胃寒者飲之多滑泄。

解

蟹毒

水蘇無毒

植生

水蘇出神農本經主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒辟惡

氣久服通神明輕身耐老以上朱字神農本經主吐血衄血血

崩以上黑字名醫所錄**名**雞蘇勞祖芥苴切余**苗**圖經曰水蘇乃雞蘇也此種多

生水岸傍苗似旋覆兩葉相當大香馥花生節間紫白色青濟間呼為水蘇江左名為薺葦吳會謂之雞蘇南人多以作菜江北甚多而人不取食又江左謂雞蘇水蘇是兩種陳藏器謂薺葦自是一物非水蘇水蘇葉有雁齒及有香薺氣辛薺葦葉上有毛稍長氣臭為異蜀本云葉似白薇兩葉相當花生節間紫白色味辛而香者即水蘇也衍義曰水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然亦如蘇但面不紫及周圍槎牙

如雁齒而地圖經曰生九真池澤及香少也江北甚多今處處有之時生春生採六

七月收乾日用葉莖色青味辛性微氣氣之厚臭香主頭風

製去根剉碎用治療圖經曰水蘇作菜除諸氣疾及脚腫

并煮汁服日華子云雞蘇治肺痿崩中帶下血痢產後中風及血不止并頭風目眩並服之瘥孟詵云水

蘇熟擣生葉綿裏塞耳聾及燒作灰淋汁或煮汁洗頭令髮香白屑不生別錄云莖葉煎取汁飲療婦人

漏下生雞蘇五合合香豉二合同杵研搗如棗核大內鼻中治衄不止

菜之草

香薷

無毒

植生

香薷主霍亂腹痛吐下散水腫

名醫所錄

名

香薷香戎

香薷石香

菜

苗

圖經曰香薷似白蘇而葉更細一作香薷俗呼香戎又一種石上生者莖葉更細而辛香彌甚

用之尤佳今人謂之石香薷也衍義曰葉如茵陳花

茸紫在一邊成穗凡四五十房為一穗如荊芥穗別

是一種香氣暑月亦可作蔬舊不著所出州土今

菜食之治暑氣不可闕者也地蜀郡陵榮資簡州及

南中諸山岩石間皆有之生二月採八月十

道地江西新定新安者佳**時**生苗月中採**收**乾

用

莖葉穗

質

類白蘇而葉細

色

黃綠

味

辛

性

微溫

氣

氣之厚者陽也

臭

香

主

消暑氣

止霍亂

製

去根莖葉剉細用勿令犯火

治

療陶隱居云作煎除水腫日華子云下氣除

煩熱療嘔逆冷氣孟詵云乾末止鼻衄水服之別錄

云水病洪腫氣脹不消食取乾者五十斤濕者亦得

劉內釜中水浸之出香薷上數寸煮使氣盡去滓沉
清之微火煎令可丸如梧子大一服五丸三日稍加
之以小便利爲度。石香薷苗莖花實俱調中溫胃
療霍亂吐瀉又口臭取一把以水一斗煮取三升稍
稍含之療舌上忽出血如鑽合蔘同切煮飲療霍
孔者煮汁服一盞日三次愈亂轉筋轉加四肢煩
令汗出而渴者。陳香薷濃煮汁少許合脂
和胡粉傅小兒白禿瘡發不生津出滲痛

薄苛

無毒

叢生

薄苛主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不
消下氣煮汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解

勞乏

名醫所錄**名**

龍腦薄苛連錢草

新羅菝葜新羅薄苛

石薄苛吳菝葜

胡菝連

蒲達蘭

苗

圖經曰

春生苗葉似荏而尖長至夏茂盛

其根經冬不死與胡薄荷相類但味少甘

為別浙人多以作茶飲之俗呼新羅薄荷天寶方云

連連錢草者是石薄荷生江南山石上葉微小至冬

而紫色不聞有別功用惟一種龍腦薄荷於蘇州郡

學前產之蓋彼達勢似龍其地居龍腦之分得稟地

脉靈異故其氣味功力倍於他所

謂之龍腦薄荷非此則皆劣矣

地

圖經曰舊不著

浙處處有之

時

生春生採夏秋

州及蘇州郡學前者為佳

時

苗春生採夏秋

收

乾暴

用

莖

質

葉類荏而尖長

色

青

味

辛

性

溫

氣

氣味俱薄陽中之陰

臭

香

行

手太陰肺經手

治

療圖經曰

傷風頭腦風通關格及

厥陰心包絡

治

小兒風涎藥性論云去憤氣發

毒汗破血止痢通利關節日華子云中風失音吐痰

及頭風等陳士良云除陰陽毒傷寒頭痛及風氣壅

併攻胸膈作茶服之立効衍義曰去小兒驚風壯熱及治骨蒸勞熱
食療云去心臟風熱杵汁服別錄云
蜂螫按**禁**新病差人勿食食
莖貼之之令人虛汗不止

菜之走

葫蘆

無毒

蔓生

葫蘆主消水腫益氣

今補

苗

謹按葫蘆三月生苗蔓延離垣及屋上其葉似瓠葉

五六月開白花結實如瓜而大嫩時甘者作茹苦者不堪噉經霜則枯取以爲器又有一種小者名瓢卽瓠瓜也亦有甘苦二種然
地處處有之
時生春生採秋取
苗葉相似但實形有異爾

用

實

色

白

味

甘

性

平

氣

氣之薄者陽中之陰

臭

朽

菜之草

甘露子

無毒

叢生

甘露子利五臟下氣清神

今補

名

滴露地蠶

苗

謹按甘露子莖高尺餘而

方枝葉兩兩相對如薄荷有毛七八月莖端作穗如水蘇開紫花其根即甘露子也世人作菜食之稀入藥用其形如蠶故又呼為地蠶也

地

處處有之

時

生春生

採

十月取根

用

根

質

形似蠶

色

白

味

甘

性

平

氣

氣之薄者陽中之陰

臭

朽

磨菰

植生

磨菰動氣發病不可多食

今補

苗

謹按磨菰乃葷之屬也苗高二三寸中空

而輕脆其色黃白五六月多生濕處今入諸湯中食之味甚鮮美但不可多食由其動氣而發病故也

地 出河南今北 **時** 生無採無 **收** 日 **色** 黃 **味** 甘 **性** 寒 **氣** 地亦有之

氣之薄者 **臭** 香 **反** 酒 **製** 初採得與米飯同炒如 **解** 陽中之陰 飯黑者有毒食之即死 磨

菰毒以生菜豆和水研濃汁飲之遂解

香菜 無毒

植生

香菜與諸菜同食氣味香辟腥 今 **苗** 謹按香菜至春宿根分蒔而生

苗高尺許莖方色紫葉似薄荷葉而小今人採葉入諸羹中由其味香以辟腥氣但不聞入藥用之 **地**

北地多 **時** 生春生 **採** 春夏 **用** 葉 **色** 青 **味** 辛 **性** 平 **氣** 厚 產之 苗 取葉

於味陽
中之陰
臭
香

菜之走

薇菜
無毒

蔓生

薇菜益氣潤肌清神强志

今補
苗
謹按薇乃菜之微者
即今之野豌豆也其

苗蔓生莖葉皆似小豆而味亦相似蜀人謂之巢菜昔官園種之以供宗廟祭祀也
地
生山野處處有

之
時
生春生採嫩時
用
莖葉
色
青綠
味
甘
性
平
氣
氣厚於味陽中

之陰
臭
香

菜之草

天花

叢生

天花食之有毒與蘑菇稍相似

補今

名

菜 天花

苗

謹按此種如蕈

生於山谷其苗高五六寸大小不等上有碎瓣如木耳而黃色數十瓣攢生一本採之以形似松花大而氣足者佳亦謂之天花菜世人惟作菜品食之未聞入藥用也

地 生五臺山谷

時 生無採時

無 日

收 乾

用 大而氣足者佳

質 類雞冠花

色 黃

味 甘

性 平

氣 之氣

薄者陽中之陰

臭 香

胡蘿蔔

無毒

叢生

胡蘿蔔主下氣調利腸胃

補今

苗

謹按胡蘿蔔乃世之常食菜品也然與菜

蕺菜類固非一種今圃人五月佈種生苗高尺許葉似胡荽葉而大其根色黃頭大尾銳至霜後採之味甘美值冬覆養至春末莖端作地處處時生夏生採叢開淡白花結實如小茴香也有之

九月取根用根色黃味甘性平氣陽中之陰臭香

秦荻梨

無毒附五心菜

叢生

秦荻梨主心腹冷脹下氣消食

名醫所錄

苗

孟詵云秦荻梨於生菜中

最香美人所噉者甚破氣之物也一種五辛菜味辛溫歲朝食之助發五臟氣常食溫中去惡消食下氣荆楚歲時記亦作此說地圖經曰生下濕味辛性溫熱病後勿食食之損目地所在有之

氣氣之厚臭香倉秦荻梨為末合酒服治卒心痛悒音陽也悒塞滿氣○子末合醋封腫氣日

三易

菜之走

醍醐菜

蔓生

醍醐菜治傷中崩絕及月水不利並擣汁和酒空心

服

名醫所錄

苗

雷公曰形似牛皮其蔓插之有乳汁出香甜入頂者是也

臭

香

製

雷公曰採

得去根以苦竹刀細切入砂盆中研如膏用生稀絹裏接取汁出煖飲

倉

醍醐杵汁合酒煎沸空心

服一盞治傷中崩絕○葉絞汁合酒煎服一盞治月水不利

一種陳藏器餘

翹搖味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜食之
又主五種黃病絞汁服之生平澤紫花蔓生如勞豆
詩義疏云苕饒幽州人謂之翹饒爾雅云柱天搖車
也○食療療五種黃病生擣汁服一升日二差甚益人利五臟明耳目去熱風令人輕健長食
不厭煮熟喫佳若生喫令人吐水

本草品彙精要卷之三十九